

Trota iridea

ALLER AMBER SUPPORT L



Mangime funzionale



DICHIARAZIONE

	3 mm	4.5 mm	6 mm	8 mm
Proteine grezze (%)	42	40	40	38
Grassi grezzi (%)	26	28	28	30
NFE (%)	18,0	18,4	18,4	17,9
Ceneri (%)	5,6	5,6	5,6	6,3
Fibre (%)	2,4	2,1	2,1	1,8
P (%)	1,0	1,0	1,0	0,9
Energia lorda (MJ)	23,7	24,0	24,0	24,2
Energia digeribile (MJ)	20,8	21,0	21,0	21,3

COMPOSIZIONE

La composizione completa compare sull'etichetta.

farina di pesce, ingredienti funzionali, oli vegetali, olio di pesce, prodotti derivati dal sangue, prodotti di grano, proteine animali trasformate, vitamine e minerali.

PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE CONSIGLIATE

Kg di mangime per 100 kg di pesce al giorno

Pesce (g)	MM	Temperatura dell'acqua (°C)								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
40-100	3 mm	0,55	0,64	0,81	0,94	1,21	1,49	1,59	1,65	1,57
100-200	4.5 mm	0,47	0,56	0,7	0,82	1,05	1,29	1,38	1,44	1,37
200-400	4.5 mm	0,42	0,49	0,62	0,72	0,92	1,14	1,21	1,27	1,2
400-600	6 mm	0,37	0,43	0,55	0,63	0,81	1	1,07	1,11	1,06
600-800	6 mm	0,32	0,38	0,48	0,56	0,72	0,88	0,94	0,98	0,93
800-1000	6 mm	0,28	0,34	0,42	0,49	0,63	0,78	0,83	0,86	0,82
>1000	8 mm	0,25	0,29	0,37	0,43	0,55	0,67	0,72	0,75	0,71

IMPATTO AMBIENTALE CON TASSI ESEMPLIFICATIVI DI CONVERSIONE DEL MANGIME.

I dati si riferiscono ad una produzione di 100 kg di pesce

	3 mm			4.5 mm			6 mm			8 mm		
Tasso di conversione	1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4	1,3	1,4	1,5
N nelle feci (kg)	0,54	0,59	0,65	0,56	0,61	0,67	0,61	0,67	0,72	0,63	0,68	0,73
N in acqua (kg)	3,43	4,05	4,67	3,73	4,32	4,9	4,32	4,9	5,49	4,52	5,08	5,64
P nelle feci (kg)	0,29	0,32	0,35	0,32	0,35	0,37	0,35	0,37	0,4	0,35	0,38	0,41
P in acqua (kg)	0,29	0,36	0,43	0,36	0,43	0,49	0,43	0,49	0,56	0,39	0,45	0,52

03/05/2024