

Pesce gatto europeo OCEAN IVORY EX



Mangime da ingrasso



DICHIARAZIONE

	3 mm	4.5 mm	6 mm
Proteine grezze (%)	56	54	54
Grassi grezzi (%)	18	20	20
NFE (%)	6,2	6,1	6,1
Ceneri (%)	10,9	11,0	11,0
Fibre (%)	0,9	0,9	0,9
P (%)	1,1	1,1	1,1
Energia lorda (MJ)	22,0	22,2	22,2
Energia digeribile (MJ)	20,5	20,6	20,6

COMPOSIZIONE

La composizione completa compare sull'etichetta.

farina di pesce, olio di pesce, prodotti di grano, proteine vegetali, vitamine e minerali.

PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE CONSIGLIATE

Kg di mangime per 100 kg di pesce al giorno

Pesce (g)	MM	Temperatura dell'acqua (°C)								
		14	16	18	20	22	24	26	28	30
50-100	3	0,53	0,88	1,41	2,11	2,64	3,17	3,52	3,17	2,82
100-150	3	0,42	0,7	1,13	1,69	2,11	2,54	2,82	2,54	2,25
150-300	4.5	0,34	0,56	0,9	1,35	1,69	2,03	2,25	2,03	1,8
300-500	4.5	0,27	0,45	0,72	1,08	1,35	1,62	1,8	1,62	1,44
500-1000	6	0,22	0,36	0,58	0,87	1,08	1,3	1,44	1,3	1,15
1000-1500	6	0,17	0,29	0,46	0,69	0,87	1,04	1,15	1,04	0,92

IMPATTO AMBIENTALE CON TASSI ESEMPLIFICATIVI DI CONVERSIONE DEL MANGIME.

I dati si riferiscono ad una produzione di 100 kg di pesce

	3 mm			4.5 mm			6 mm		
Tasso di conversione	0,8	0,9	1	0,9	1	1,1	1	1,1	1,2
N nelle feci (kg)	0,41	0,47	0,52	0,47	0,52	0,57	0,52	0,57	0,62
N in acqua (kg)	3,75	4,56	5,37	4,56	5,37	6,18	5,37	6,18	7
P nelle feci (kg)	0,27	0,3	0,33	0,3	0,33	0,37	0,33	0,37	0,4
P in acqua (kg)	0,19	0,27	0,35	0,27	0,35	0,42	0,35	0,42	0,5

IMPATTO AMBIENTALE MISURATO IN CO₂-EQ

Le figure sono in equivalenti di CO₂ (kg/kg feed)

	3 mm	4.5 mm	6 mm
CO ₂ -eq. con uso del suolo	1,09-1,28	1,09-1,25	1,07-1,48
CO ₂ -eq. senza nessuna cambio dell'uso del suolo	1,07-1,22	1,07-1,21	1,09-1,51