

# Rodaballo OCEAN NOVA EX FLOAT



Pienso de engorde



## DECLARACIÓN

|                         | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm | 11 mm |
|-------------------------|------|--------|------|------|-------|
| Proteína bruta (%)      | 51   | 51     | 51   | 50   | 50    |
| Grasa bruta (%)         | 12   | 12     | 12   | 14   | 14    |
| NFE ( % )               | 19,7 | 19,7   | 19,7 | 18,1 | 18,1  |
| Cenizas (%)             | 9,8  | 9,8    | 9,8  | 9,6  | 9,6   |
| Fibras (%)              | 2,5  | 2,5    | 2,5  | 2,3  | 2,3   |
| P (%)                   | 1,4  | 1,4    | 1,4  | 1,3  | 1,3   |
| Energía bruta (MJ)      | 20,6 | 20,6   | 20,6 | 20,8 | 20,8  |
| Energía digestible (MJ) | 17,4 | 17,4   | 17,4 | 17,7 | 17,7  |

## COMPOSICIÓN

Consulte la etiqueta para la composición exacta.

aceite de pescado, harina de pescado, productos de grano, proteínas vegetales, vitaminas y minerales.

## TABLA DE ALIMENTACIÓN INDICATIVA

Kg de pienso por 100 kg de peces por día

| Pez (gr)  | MM     | Temperatura del agua (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |        | 4                         | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   |
| 20-50     | 3 mm   | 0,56                      | 0,66 | 0,78 | 0,93 | 1,12 | 1,36 | 1,61 | 1,94 | 2,07 |
| 50-100    | 4.5 mm | 0,39                      | 0,46 | 0,55 | 0,65 | 0,78 | 0,95 | 1,13 | 1,36 | 1,45 |
| 100-300   | 6 mm   | 0,27                      | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,67 | 0,79 | 0,95 | 1,01 |
| 300-500   | 8 mm   | 0,19                      | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 0,55 | 0,67 | 0,71 |
| 500-1000  | 11 mm  | 0,13                      | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,47 | 0,5  |
| 1000-1500 | 11 mm  | 0,09                      | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,34 |
| >1500     | 11 mm  | 0,06                      | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,24 |

## IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN FUNCIÓN DE DIFERENTES ÍNDICES DE CONVERSIÓN

Los datos correspondientes a 100 kg de peces producidos

|                      | 3 mm |      |      | 4.5 mm |      |      | 6 mm |      |      | 8 mm |      |      | 11 mm |      |      |
|----------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Índice de conversión | 0,9  | 1    | 1,1  | 1      | 1,1  | 1,2  | 1,1  | 1,2  | 1,3  | 1,2  | 1,3  | 1,4  | 1,3   | 1,4  | 1,5  |
| N en las heces (kg)  | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,49   | 0,54 | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,83  | 0,9  | 0,96 |
| N en el agua (kg)    | 4,15 | 4,92 | 5,69 | 4,92   | 5,69 | 6,45 | 5,69 | 6,45 | 7,22 | 6,45 | 7,22 | 7,99 | 6,82  | 7,55 | 8,29 |
| P en las heces (kg)  | 0,3  | 0,33 | 0,36 | 0,33   | 0,36 | 0,4  | 0,36 | 0,4  | 0,43 | 0,4  | 0,43 | 0,46 | 0,51  | 0,55 | 0,59 |
| P en el agua (kg)    | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,34   | 0,42 | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,77  | 0,86 | 0,95 |

## IMPACTO AMBIENTAL MEDIDO EN CO<sub>2</sub>-EQV

Las cifras están en equivalentes de CO<sub>2</sub> (kg/kg de pienso)

|                                                  | 3 mm      | 4.5 mm    | 6 mm      | 8 mm      | 11 mm     |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -eq. con cambio de uso de tierra | 1,15-1,23 | 1,15-1,23 | 1,15-1,23 | 1,22-1,22 | 1,22-1,22 |
| CO <sub>2</sub> -eq. sin cambio de uso de tierra | 1,08-1,16 | 1,08-1,16 | 1,08-1,16 | 1,16-1,16 | 1,16-1,16 |

03/05/2024