

# Regnbueørred ALLER GOLD



## Voksefoder



### DEKLARATION

|                        | 3 mm      | 4.5 mm    | 6 mm      | 8 mm      |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Råprotein (%)          | 44-46     | 42-44     | 40-42     | 40-42     |
| Råfedt (%)             | 26-28     | 28-30     | 30-32     | 30-32     |
| NFE (%)                | 12,5-15,5 | 12,5-15,5 | 12,5-15,5 | 12,5-15,5 |
| Råaske (%)             | 6,5-8,5   | 6,0-8,0   | 6,0-8,0   | 6,0-8,0   |
| Træstof (%)            | 0,7-1,9   | 0,7-1,9   | 0,7-1,9   | 0,7-1,9   |
| P (%)                  | 0,9       | 0,9       | 0,9       | 0,9       |
| Bruttoenergi (MJ)      | 23,5-26,5 | 23,9-26,9 | 24,1-27,1 | 24,1-27,1 |
| Fordøjelig energi (MJ) | 21,3      | 21,6      | 22,0      | 22,0      |

### SAMMENSÆTNING

For aktuel sammensætning henvises til foderets mærkning.

blodprodukter, fiskemel, fiskeolie, forarbejdede animalske proteiner, kornprodukter, vegetabilske olier, vegetabilske proteiner, vitaminer og mineraler.

### VEJLEDENDE FODERTABEL

Kg foder per 100 kg fisk per dag

| Fisk (gr) | MM     | Vandtemperatur (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |        | 2                   | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |
| 40-100    | 3 mm   | 0,53                | 0,63 | 0,79 | 0,92 | 1,18 | 1,45 | 1,55 | 1,61 | 1,53 |
| 100-200   | 4.5 mm | 0,46                | 0,55 | 0,69 | 0,8  | 1,03 | 1,26 | 1,35 | 1,4  | 1,33 |
| 200-400   | 4.5 mm | 0,41                | 0,48 | 0,61 | 0,7  | 0,9  | 1,11 | 1,19 | 1,24 | 1,17 |
| 400-600   | 6 mm   | 0,35                | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,78 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,01 |
| 600-800   | 6 mm   | 0,31                | 0,37 | 0,46 | 0,53 | 0,68 | 0,84 | 0,9  | 0,94 | 0,89 |
| 800-1000  | 6 mm   | 0,27                | 0,32 | 0,4  | 0,47 | 0,6  | 0,74 | 0,79 | 0,82 | 0,78 |
| >1000     | 8 mm   | 0,24                | 0,28 | 0,36 | 0,41 | 0,53 | 0,65 | 0,7  | 0,73 | 0,69 |

### MILJØPÅVIRKNING VED FORSKELLIGE FODERKVOTIENTER.

Tallene er for produktion af 100 kg fisk

|                   | 3 mm |      |      | 4.5 mm |      |      | 6 mm |      |      | 8 mm |      |      |
|-------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Foderkvotient     | 0,8  | 0,9  | 1    | 0,9    | 1    | 1,1  | 1    | 1,1  | 1,2  | 1,1  | 1,2  | 1,3  |
| N i fækalier (kg) | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,5    | 0,55 | 0,61 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,63 | 0,68 |
| N i vand (kg)     | 2,55 | 3,21 | 3,87 | 2,95   | 3,58 | 4,21 | 3,29 | 3,89 | 4,49 | 3,89 | 4,49 | 5,1  |
| P i fækalier (kg) | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,24   | 0,27 | 0,3  | 0,27 | 0,3  | 0,32 | 0,3  | 0,32 | 0,35 |
| P i vand (kg)     | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,19   | 0,25 | 0,31 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,26 | 0,33 | 0,39 |

### MILJØPÅVIRKNING MÅLT I CO<sub>2</sub>-EQ

Angivet som CO<sub>2</sub>-ækvivalent (kg/kg foder)

|                                           | 3 mm      | 4.5 mm    | 6 mm      | 8 mm      |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -eq. med arealanvendelse  | 1,41-1,72 | 1,34-1,80 | 1,36-1,71 | 1,36-1,71 |
| CO <sub>2</sub> -eq. uden arealanvendelse | 1,17-1,34 | 1,07-1,38 | 1,12-1,38 | 1,12-1,38 |