

# Regnbueørred ALLER BRONZE



## Voksefoder



### DEKLARATION

|                        | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
|------------------------|------|--------|------|------|
| Råprotein (%)          | 45   | 45     | 45   | 45   |
| Råfedt (%)             | 15   | 15     | 15   | 15   |
| NFE (%)                | 22,3 | 22,3   | 22,3 | 22,3 |
| Råaske (%)             | 6,5  | 6,5    | 6,5  | 6,5  |
| Træstof (%)            | 3,2  | 3,2    | 3,2  | 3,2  |
| P (%)                  | 1,1  | 1,1    | 1,1  | 1,1  |
| Bruttoenergi (MJ)      | 21,2 | 21,2   | 21,2 | 21,2 |
| Fordøjelig energi (MJ) | 17,6 | 17,6   | 17,6 | 17,6 |

### SAMMENSÆTNING

For aktuel sammensætning henvises til foderets mærkning.

blodprodukter, enkeltcelleproteiner, fiskemel, forarbejdede animalske olier, forarbejdede animalske proteiner, ikke-marine biprodukter, kornprodukter, marine biprodukter, vegetabilske olier, vegetabilske proteiner, vitaminer og mineraler.

### VEJLEDENDE FODERTABEL

Kg foder per 100 kg fisk per dag

| Fisk (gr) | MM  | Vandtemperatur (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |     | 2                   | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |
| 40-100    | 3   | 0,64                | 0,76 | 0,95 | 1,11 | 1,42 | 1,75 | 1,87 | 1,95 | 1,85 |
| 100-200   | 4.5 | 0,57                | 0,67 | 0,84 | 0,98 | 1,25 | 1,54 | 1,64 | 1,71 | 1,63 |
| 200-400   | 4.5 | 0,5                 | 0,59 | 0,74 | 0,86 | 1,1  | 1,36 | 1,45 | 1,51 | 1,43 |
| 400-600   | 6   | 0,44                | 0,52 | 0,65 | 0,76 | 0,97 | 1,19 | 1,27 | 1,33 | 1,26 |
| 600-800   | 6   | 0,39                | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,85 | 1,05 | 1,12 | 1,17 | 1,11 |
| 800-1000  | 6   | 0,34                | 0,4  | 0,5  | 0,59 | 0,75 | 0,92 | 0,99 | 1,03 | 0,98 |
| >1000     | 8   | 0,3                 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,66 | 0,81 | 0,87 | 0,9  | 0,86 |

### MILJØPÅVIRKNING VED FORSKELLIGE FODERKVOTIENTER.

Tallene er for produktion af 100 kg fisk

|                   | 3 mm |      |      | 4.5 mm |      |      | 6 mm |      |      | 8 mm |      |      |
|-------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Foderkvotient     | 1    | 1,1  | 1,2  | 1,1    | 1,2  | 1,3  | 1,2  | 1,3  | 1,4  | 1,3  | 1,4  | 1,5  |
| N i fækalier (kg) | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,63   | 0,69 | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 0,86 |
| N i vand (kg)     | 3,87 | 4,54 | 5,2  | 4,54   | 5,2  | 5,86 | 5,2  | 5,86 | 6,52 | 5,86 | 6,52 | 7,19 |
| P i fækalier (kg) | 0,27 | 0,3  | 0,32 | 0,3    | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,41 |
| P i vand (kg)     | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,31   | 0,38 | 0,44 | 0,38 | 0,44 | 0,5  | 0,39 | 0,45 | 0,52 |

### MILJØPÅVIRKNING MÅLT I CO<sub>2</sub>-EQ

Angivet som CO<sub>2</sub>-ækvivalent (kg/kg foder)

|                                           | 3 mm      | 4.5 mm    | 6 mm      | 8 mm      |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -eq. med arealanvendelse  | 1,29-3,43 | 1,29-3,43 | 1,29-3,43 | 1,29-3,43 |
| CO <sub>2</sub> -eq. uden arealanvendelse | 0,97-2,12 | 0,97-2,12 | 0,97-2,12 | 0,97-2,12 |

04/05/2024