

# Sandart OCEAN IVORY EX, 2 MM



Sættefisk foder



## DEKLARATION

|                        | 2 mm |
|------------------------|------|
| Råprotein (%)          | 56   |
| Råfedt (%)             | 18   |
| NFE (%)                | 6,2  |
| Råaske (%)             | 10,9 |
| Træstof (%)            | 0,9  |
| P (%)                  | 1,1  |
| Bruttoenergi (MJ)      | 22,0 |
| Fordøjelig energi (MJ) | 20,5 |

## SAMMENSÆTNING

For aktuel sammensætning henvises til foderets mærkning.

fiskemel, fiskeolie, kornprodukter, vegetabilske proteiner, vitaminer og mineraler.

## VEJLEDENDE FODERTABEL

Kg foder per 100 kg fisk per dag

| Fisk (gr) | MM   | Vandtemperatur (°C) |      |      |      |      |
|-----------|------|---------------------|------|------|------|------|
|           |      | 20                  | 22   | 24   | 26   | 28   |
| 15-20     | 2 mm | 1,05                | 1,31 | 1,58 | 1,75 | 1,58 |
| 20-50     | 2 mm | 0,95                | 1,18 | 1,42 | 1,58 | 1,42 |

## MILJØPÅVIRKNING VED FORSKELLIGE FODERKVOTIENTER.

Tallene er for produktion af 100 kg fisk

|                   | 2 mm |      |      |
|-------------------|------|------|------|
| Foderkvotient     | 0,8  | 0,9  | 1    |
| N i fækalier (kg) | 0,41 | 0,47 | 0,52 |
| N i vand (kg)     | 3,75 | 4,56 | 5,37 |
| P i fækalier (kg) | 0,27 | 0,3  | 0,33 |
| P i vand (kg)     | 0,19 | 0,27 | 0,35 |

## MILJØPÅVIRKNING MÅLT I CO<sub>2</sub>-EQ

Angivet som CO<sub>2</sub>-ækvivalent (kg/kg foder)

|                                           | 2 mm      |
|-------------------------------------------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -eq. med arealanvendelse  | 1,09-1,28 |
| CO <sub>2</sub> -eq. uden arealanvendelse | 1,07-1,22 |

07/05/2024