

Sandart OCEAN IVORY EX



Voksefoder



DEKLARATION

	3 mm	4.5 mm	6 mm
Råprotein (%)	56	54	54
Råfedt (%)	18	20	20
NFE (%)	6,2	6,1	6,1
Råaske (%)	10,9	11,0	11,0
Træstof (%)	0,9	0,9	0,9
P (%)	1,1	1,1	1,1
Bruttoenergi (MJ)	22,0	22,2	22,2
Fordøjelig energi (MJ)	20,5	20,6	20,6

SAMMENSÆTNING

For aktuel sammensætning henvises til foderets mærkning.

fiskemel, fiskeolie, kornprodukter, vegetabiliske proteiner, vitaminer og mineraler.

VEJLEDENDE FODERTABEL

Kg foder per 100 kg fisk per dag

Fisk (gr)	MM	Vandtemperatur (°C)				
		20	22	24	26	28
50-100	3 mm	0,88	1,09	1,31	1,46	1,31
100-150	4.5 mm	0,78	0,98	1,17	1,3	1,17
150-300	4.5 mm	0,7	0,88	1,06	1,17	1,06
300-500	6 mm	0,63	0,79	0,95	1,06	0,95
500-1000	6 mm	0,57	0,71	0,86	0,95	0,86
>1000	6 mm	0,51	0,64	0,77	0,86	0,77

MILJØPÅVIRKNING VED FORSKELLIGE FODERKVOTIENTER.

Tallene er for produktion af 100 kg fisk

	3 mm			4.5 mm			6 mm		
Foderkvotient	0,8	0,9	1	0,9	1	1,1	1	1,1	1,2
N i fækalier (kg)	0,41	0,47	0,52	0,47	0,52	0,57	0,52	0,57	0,62
N i vand (kg)	3,75	4,56	5,37	4,56	5,37	6,18	5,37	6,18	7
P i fækalier (kg)	0,27	0,3	0,33	0,3	0,33	0,37	0,33	0,37	0,4
P i vand (kg)	0,19	0,27	0,35	0,27	0,35	0,42	0,35	0,42	0,5

MILJØPÅVIRKNING MÅLT I CO₂-EQ

Angivet som CO₂-ækvivalent (kg/kg foder)

	3 mm	4.5 mm	6 mm
CO ₂ -eq. med arealanvendelse	1,09-1,28	1,09-1,25	1,07-1,48
CO ₂ -eq. uden arealanvendelse	1,07-1,22	1,07-1,21	1,09-1,51