

Yellowtail kingfish

ALLER THALASSA EX GR, 0.5-2.0 MM



Ynglefoder



DEKLARATION

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
Råprotein (%)	62	62	60
Råfedt (%)	12	12	14
NFE (%)	6,2	6,2	6,6
Råaske (%)	13,0	13,0	12,6
Træstof (%)	0,8	0,8	0,8
P (%)	1,4	1,4	1,4
Bruttoenergi (MJ)	20,6	20,6	21,0
Fordøjelig energi (MJ)	19,1	19,1	19,3

SAMMENSÆTNING

For aktuel sammensætning henvises til foderets mærkning.

excellent protein, fiskemel, fiskeolie, funktionelle ingredienser, kornprodukter, krillmel, vegetabiliske proteiner, vitaminer og mineraler.

VEJLEDENDE FODERTABEL

Kg foder per 100 kg fisk per dag

Fisk (gr)	Granulate	Vandtemperatur (°C)									
			12	14	16	18	20	22	24	26	28
1-4	0.5-1.0	0.5 - 1.0	2,63	3,68	4,74	5,79	6,84	8,42	11	10,53	8,95
4-7	0.9-1.6	0.9 - 1.6	2,16	3,02	3,88	4,75	5,61	6,9	8,2	8,63	7,33
7-10	1.3-2.0	1.3 - 2.0	1,66	2,32	2,99	3,65	4,31	5,31	6,3	6,63	5,64

MILJØPÅVIRKNING VED FORSKELLIGE FODERKVOTIENTER.

Tallene er for produktion af 100 kg fisk

	0.5-1.0 mm			0.9-1.6 mm			1.3-2.0 mm		
Foderkvotient	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
N i fækalier (kg)	0,3	0,36	0,42	0,36	0,42	0,48	0,4	0,46	0,52
N i vand (kg)	1,91	2,84	3,78	2,84	3,78	4,71	3,57	4,47	5,37
P i fækalier (kg)	0,21	0,25	0,29	0,25	0,29	0,34	0,29	0,34	0,38
P i vand (kg)	0,06	0,16	0,26	0,16	0,26	0,35	0,26	0,35	0,45

MILJØPÅVIRKNING MÅLT I CO₂-EQ

Angivet som CO₂-ækvivalent (kg/kg foder)

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
CO ₂ -eq. med arealanvendelse	1,11-1,28	1,11-1,28	1,11-1,28
CO ₂ -eq. uden arealanvendelse	1,08-1,23	1,08-1,23	1,08-1,23

08/05/2024