



Lubina  
OCEAN BLUE EX

Pienso de engorde



DECLARACIÓN

|                         | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm |
|-------------------------|------|--------|------|
| Proteína bruta (%)      | 46   | 41     | 40   |
| Grasa bruta (%)         | 16   | 19     | 20   |
| NFE ( %)                | 20,4 | 22,7   | 22,8 |
| Cenizas (%)             | 7,4  | 6,4    | 6,4  |
| Fibras (%)              | 2,3  | 2,8    | 2,8  |
| P (%)                   | 1,0  | 0,9    | 0,9  |
| Energía bruta (MJ)      | 21,0 | 21,6   | 21,7 |
| Energía digestible (MJ) | 17,6 | 17,6   | 17,8 |

COMPOSICIÓN

Consulte la etiqueta para la composición exacta.

aceite de pescado, aceites vegetales, harina de pescado, productos de grano, proteínas unicelulares, proteínas vegetales, subproductos marinos, subproductos no marinos, vitaminas y minerales.

TABLA DE ALIMENTACIÓN INDICATIVA

Kg de pienso por 100 kg de peces por día

| Pez (gr) | MM     | Temperatura del agua (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |        | 12                        | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   | 28   |
| 20-50    | 3 mm   | 0,88                      | 1,23 | 1,59 | 1,94 | 2,29 | 2,82 | 3,35 | 3,53 | 3    |
| 50-100   | 3 mm   | 0,69                      | 0,96 | 1,24 | 1,51 | 1,79 | 2,2  | 2,61 | 2,75 | 2,34 |
| 100-200  | 4.5 mm | 0,54                      | 0,75 | 0,96 | 1,18 | 1,39 | 1,71 | 2,03 | 2,14 | 1,82 |
| 200-400  | 4.5 mm | 0,42                      | 0,58 | 0,75 | 0,92 | 1,09 | 1,34 | 1,59 | 1,67 | 1,42 |
| 400-600  | 6 mm   | 0,32                      | 0,45 | 0,58 | 0,71 | 0,84 | 1,03 | 1,23 | 1,29 | 1,1  |
| >600     | 6 mm   | 0,25                      | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,8  | 0,95 | 1    | 0,85 |

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN FUNCIÓN DE DIFERENTES ÍNDICES DE CONVERSIÓN

Los datos correspondientes a 100 kg de peces producidos

|                      | 3 mm |      |      | 4.5 mm |      |      | 6 mm |      |      |
|----------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| Índice de conversión | 1,3  | 1,4  | 1,5  | 1,4    | 1,5  | 1,6  | 1,5  | 1,6  | 1,7  |
| N en las heces (kg)  | 0,77 | 0,82 | 0,88 | 0,73   | 0,79 | 0,84 | 0,77 | 0,82 | 0,87 |
| N en el agua (kg)    | 6,05 | 6,73 | 7,41 | 5,7    | 6,3  | 6,91 | 6,08 | 6,67 | 7,26 |
| P en las heces (kg)  | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,42   | 0,45 | 0,48 | 0,45 | 0,48 | 0,51 |
| P en el agua (kg)    | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,55   | 0,62 | 0,69 | 0,62 | 0,69 | 0,76 |

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDO EN CO<sub>2</sub>-EQV

Las cifras están en equivalentes de CO<sub>2</sub> (kg/kg de pienso)

|                                                  | 3 mm      | 4.5 mm    | 6 mm      |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -eq. con cambio de uso de tierra | 1,19-1,87 | 1,51-1,88 | 1,58-1,88 |
| CO <sub>2</sub> -eq. sin cambio de uso de tierra | 0,91-1,21 | 1,05-1,20 | 1,08-1,16 |