

# Trota iridea

## ALLER FUTURA EX GR, 0.5-2.0 MM



Mangime per avannotti



### DICHIARAZIONE

|                         | 0.5-1.0 mm | 0.9-1.6 mm | 1.3-2.0 mm |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Proteine grezze (%)     | 60         | 60         | 58         |
| Grassi grezzi (%)       | 15         | 15         | 17         |
| NFE (%)                 | 5,7        | 5,7        | 6,1        |
| Ceneri (%)              | 12,6       | 12,6       | 12,2       |
| Fibre (%)               | 0,7        | 0,7        | 0,7        |
| P (%)                   | 1,4        | 1,4        | 1,4        |
| Energia lorda (MJ)      | 21,2       | 21,2       | 21,6       |
| Energia digeribile (MJ) | 19,7       | 19,7       | 20,0       |

### COMPOSIZIONE

La composizione completa compare sull'etichetta.

farina di krill, farina di pesce, ingredienti funzionali, olio di pesce, prodotti di grano, proteine di una singola cellula, proteine vegetali, vitamine e minerali.

### PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE CONSIGLIATE

Kg di mangime per 100 kg di pesce al giorno

| Pesce (g) | Granulate | Temperatura dell'acqua (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |           |                             | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |
| 0.5-2.0   | 0.5-1.0   | 0.5-1.0                     | 0,99 | 1,32 | 1,64 | 1,97 | 2,47 | 2,96 | 3,16 | 3,29 | 3,09 |
| 2.0-7.0   | 0.9-1.6   | 0.9-1.6                     | 0,84 | 1,12 | 1,4  | 1,68 | 2,1  | 2,52 | 2,68 | 2,8  | 2,63 |
| 7.0-15.0  | 1.3-2.0   | 1.3-2.0                     | 0,7  | 0,94 | 1,17 | 1,41 | 1,76 | 2,11 | 2,25 | 2,34 | 2,2  |

### IMPATTO AMBIENTALE CON TASSI ESEMPLIFICATIVI DI CONVERSIONE DEL MANGIME.

I dati si riferiscono ad una produzione di 100 kg di pesce

|                      | 0.5-1.0 mm |      |      | 0.9-1.6 mm |      |      | 1.3-2.0 mm |      |      |
|----------------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| Tasso di conversione | 0,5        | 0,6  | 0,7  | 0,6        | 0,7  | 0,8  | 0,7        | 0,8  | 0,9  |
| N nelle feci (kg)    | 0,29       | 0,35 | 0,4  | 0,35       | 0,4  | 0,46 | 0,39       | 0,45 | 0,5  |
| N in acqua (kg)      | 1,76       | 2,66 | 3,57 | 2,66       | 3,57 | 4,47 | 3,36       | 4,23 | 5,1  |
| P nelle feci (kg)    | 0,21       | 0,25 | 0,29 | 0,25       | 0,29 | 0,34 | 0,29       | 0,34 | 0,38 |
| P in acqua (kg)      | 0,06       | 0,16 | 0,26 | 0,16       | 0,26 | 0,35 | 0,26       | 0,35 | 0,45 |

### IMPATTO AMBIENTALE MISURATO IN CO<sub>2</sub>-EQ

Le figure sono in equivalenti di CO<sub>2</sub> (kg/kg feed)

|                                                              | 0.5-1.0 mm | 0.9-1.6 mm | 1.3-2.0 mm |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| CO <sub>2</sub> -eq. con uso del suolo                       | 1,11-1,28  | 1,11-1,28  | 1,11-1,28  |
| CO <sub>2</sub> -eq. senza nessuna cambio dell'uso del suolo | 1,08-1,23  | 1,08-1,23  | 1,08-1,23  |

19/05/2024