

Ricciola OCEAN IVORY EX



Mangime da ingrasso



DICHIARAZIONE

	3 mm	4.5 mm	6 mm
Proteine grezze (%)	56	54	54
Grassi grezzi (%)	18	20	20
NFE (%)	6,2	6,1	6,1
Ceneri (%)	10,9	11,0	11,0
Fibre (%)	0,9	0,9	0,9
P (%)	1,1	1,1	1,1
Energia lorda (MJ)	22,0	22,2	22,2
Energia digeribile (MJ)	20,5	20,6	20,6

COMPOSIZIONE

La composizione completa compare sull'etichetta.

farina di pesce, olio di pesce, prodotti di grano, proteine vegetali, vitamine e minerali.

PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE CONSIGLIATE

Kg di mangime per 100 kg di pesce al giorno

Pesce (g)	MM	Temperatura dell'acqua (°C)								
		12	14	16	18	20	22	24	26	28
20-50	3 mm	0,83	1,16	1,49	1,82	2,15	2,64	3,14	3,3	2,81
50-100	3 mm	0,64	0,9	1,16	1,42	1,67	2,06	2,45	2,58	2,19
100-150	3 mm	0,5	0,7	0,9	1,11	1,31	1,61	1,91	2,01	1,71
150-300	4.5 mm	0,39	0,55	0,71	0,86	1,02	1,25	1,49	1,57	1,33
300-500	4.5 mm	0,31	0,43	0,55	0,67	0,79	0,98	1,16	1,22	1,04
500-1000	6 mm	0,24	0,33	0,43	0,52	0,62	0,76	0,91	0,95	0,81
1000-1500	6 mm	0,19	0,26	0,33	0,41	0,48	0,6	0,71	0,74	0,63

IMPATTO AMBIENTALE CON TASSI ESEMPLIFICATIVI DI CONVERSIONE DEL MANGIME.

I dati si riferiscono ad una produzione di 100 kg di pesce

	3 mm			4.5 mm			6 mm		
Tasso di conversione	0,9	1	1,1	1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3
N nelle feci (kg)	0,62	0,69	0,76	0,69	0,76	0,83	0,76	0,83	0,9
N in acqua (kg)	4,4	5,2	5,99	5,2	5,99	6,79	5,99	6,79	7,58
P nelle feci (kg)	0,41	0,45	0,5	0,45	0,5	0,54	0,5	0,54	0,59
P in acqua (kg)	0,52	0,62	0,73	0,62	0,73	0,83	0,73	0,83	0,94

IMPATTO AMBIENTALE MISURATO IN CO₂-EQ

Le figure sono in equivalenti di CO₂ (kg/kg feed)

	3 mm	4.5 mm	6 mm
CO ₂ -eq. con uso del suolo	1,09-1,28	1,09-1,25	1,07-1,48
CO ₂ -eq. senza nessuna cambio dell'uso del suolo	1,07-1,22	1,07-1,21	1,09-1,51

28/04/2024