



Sandacz OCEAN IVORY EX

Pasza wzrostowa



SKŁAD

	3 mm	4.5 mm	6 mm
Białko (%)	56	54	54
Tłuszcz (%)	18	20	20
NFE (%)	6,2	6,1	6,1
Popiół (%)	10,9	11,0	11,0
Włókno (%)	0,9	0,9	0,9
P (%)	1,1	1,1	1,1
Energia całkowita (MJ)	22,0	22,2	22,2
Energia strawna (MJ)	20,5	20,6	20,6

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie
białka roślinne, maczka rybna, olej rybny, produkty zbożowe, witaminy i minerały.

ZAŁECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

Ryba (g)	MM	Temperatura wody (°C)				
		20	22	24	26	28
50-100	3 mm	0,88	1,09	1,31	1,46	1,31
100-150	4.5 mm	0,78	0,98	1,17	1,3	1,17
150-300	4.5 mm	0,7	0,88	1,06	1,17	1,06
300-500	6 mm	0,63	0,79	0,95	1,06	0,95
500-1000	6 mm	0,57	0,71	0,86	0,95	0,86
>1000	6 mm	0,51	0,64	0,77	0,86	0,77

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	3 mm			4.5 mm			6 mm		
Współczynnik pokarmowy	0,8	0,9	1	0,9	1	1,1	1	1,1	1,2
N w odchodach (kg)	0,41	0,47	0,52	0,47	0,52	0,57	0,52	0,57	0,62
N w wodzie (kg)	3,75	4,56	5,37	4,56	5,37	6,18	5,37	6,18	7
P w odchodach (kg)	0,27	0,3	0,33	0,3	0,33	0,37	0,33	0,37	0,4
P w wodzie (kg)	0,19	0,27	0,35	0,27	0,35	0,42	0,35	0,42	0,5

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO₂E

Wartości są w CO₂e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	3 mm	4.5 mm	6 mm
CO ₂ -eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,09-1,28	1,09-1,25	1,07-1,48
CO ₂ -eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	1,07-1,22	1,07-1,21	1,09-1,51