

Trota fario

ALLER FUTURA EX GR, 0.5-2.0 MM



Mangime per avannotti



DICHIARAZIONE

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
Proteine grezze (%)	60	60	58
Grassi grezzi (%)	15	15	17
NFE (%)	5,7	5,7	6,1
Ceneri (%)	12,6	12,6	12,2
Fibre (%)	0,7	0,7	0,7
P (%)	1,4	1,4	1,4
Energia lorda (MJ)	21,2	21,2	21,6
Energia digeribile (MJ)	19,7	19,7	20,0

COMPOSIZIONE

La composizione completa compare sull'etichetta.

farina di krill, farina di pesce, ingredienti funzionali, olio di pesce, prodotti di grano, proteine di una singola cellula, proteine vegetali, vitamine e minerali.

PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE CONSIGLIATE

Kg di mangime per 100 kg di pesce al giorno

Pesce (g)	Granulate	Temperatura dell'acqua (°C)									
			2	4	6	8	10	12	14	16	18
0.5-2.0	0.5-1.0	0.5 - 1.0	0,99	1,32	1,64	1,97	2,47	2,96	3,16	3,29	3,09
2.0-7.0	0.9-1.6	0.9 - 1.6	0,84	1,12	1,4	1,68	2,1	2,52	2,68	2,8	2,63
7.0-15.0	1.3-2.0	1.3 - 2.0	0,7	0,94	1,17	1,41	1,76	2,11	2,25	2,34	2,2

IMPATTO AMBIENTALE CON TASSI ESEMPLIFICATIVI DI CONVERSIONE DEL MANGIME.

I dati si riferiscono ad una produzione di 100 kg di pesce

	0.5-1.0 mm			0.9-1.6 mm			1.3-2.0 mm		
Tasso di conversione	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
N nelle feci (kg)	0,29	0,35	0,4	0,35	0,4	0,46	0,39	0,45	0,5
N in acqua (kg)	1,76	2,66	3,57	2,66	3,57	4,47	3,36	4,23	5,1
P nelle feci (kg)	0,21	0,25	0,29	0,25	0,29	0,34	0,29	0,34	0,38
P in acqua (kg)	0,06	0,16	0,26	0,16	0,26	0,35	0,26	0,35	0,45

IMPATTO AMBIENTALE MISURATO IN CO₂-EQ

Le figure sono in equivalenti di CO₂ (kg/kg feed)

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
CO ₂ -eq. con uso del suolo	1,11-1,28	1,11-1,28	1,11-1,28
CO ₂ -eq. senza nessuna cambio dell'uso del suolo	1,08-1,23	1,08-1,23	1,08-1,23