

Πέστροφα ALLER FUTURA EX GR, 0.5-2.0 mm



Τροφή για ιχθύδια



ΣΥΣΤΑΣΗ

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
Ολική πρωτεΐνη (%)	60	60	58
Ολικό λίπος (%)	15	15	17
ΕΝΕΟ (%)	5,7	5,7	6,1
Τέφρα (%)	12,6	12,6	12,2
Φυτικές Ίνες (%)	0,7	0,7	0,7
P (%)	1,4	1,4	1,4
Ολική ενέργεια (MJ)	21,2	21,2	21,6
Πεπτή ενέργεια (MJ)	19,7	19,7	20,0

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η αναλυτική σύνθεση φαίνεται πάνω στην ετικέτα

άλεуро κρίλ, βιταμίνες και μέταλλα, ιχθυάλεуро, ιχθυέλαιο, λειτουργικά συστατικά, προϊόντα σιτηρών, πρωτεΐνες ενός κυττάρου, φυτικές πρωτεΐνες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

κιλά τροφής ανά 100 κιλά ψαριού ημερησίως

Βάρος ψαριού (γρ)	Granulate	Θερμοκρασία νερού (°C)									
			2	4	6	8	10	12	14	16	18
0.5-2.0	0.5-1.0	0.5-1.0	0,99	1,32	1,64	1,97	2,47	2,96	3,16	3,29	3,09
2.0-7.0	0.9-1.6	0.9-1.6	0,84	1,12	1,4	1,68	2,1	2,52	2,68	2,8	2,63
7.0-15.0	1.3-2.0	1.3-2.0	0,7	0,94	1,17	1,41	1,76	2,11	2,25	2,34	2,2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΕΣ

Τα στοιχεία είναι ανά 100 kg παραγωγής ψαριών

	0.5-1.0 mm			0.9-1.6 mm			1.3-2.0 mm		
Μετατρεψιμότητα	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
N στα περιττώματα (kg)	0,29	0,35	0,4	0,35	0,4	0,46	0,39	0,45	0,5
N στο νερό (kg)	1,76	2,66	3,57	2,66	3,57	4,47	3,36	4,23	5,1
P στα περιττώματα (kg)	0,21	0,25	0,29	0,25	0,29	0,34	0,29	0,34	0,38
P στο νερό (kg)	0,06	0,16	0,26	0,16	0,26	0,35	0,26	0,35	0,45

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΣΕ CO₂- EQ

Οι μετρήσεις εκφράζονται σε ισοδύναμο του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO₂) kg/kg τροφής)

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
Ισοδ.CO ₂ με αλλαγή χρήσης γης	1,11-1,28	1,11-1,28	1,11-1,28
Ισοδ.CO ₂ χωρίς αλλαγή χρήσης γης	1,08-1,23	1,08-1,23	1,08-1,23

20/04/2024