



ΣΥΣΤΑΣΗ

|                     | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm |
|---------------------|------|--------|------|
| Ολική πρωτεΐνη (%)  | 46   | 41     | 40   |
| Ολικό λίπος (%)     | 16   | 19     | 20   |
| ΕΝΕΟ (%)            | 20,4 | 22,7   | 22,8 |
| Τέφρα (%)           | 7,4  | 6,4    | 6,4  |
| Φυτικές Ίνες (%)    | 2,3  | 2,8    | 2,8  |
| P (%)               | 1,0  | 0,9    | 0,9  |
| Ολική ενέργεια (MJ) | 21,0 | 21,6   | 21,7 |
| Πεπτή ενέργεια (MJ) | 17,6 | 17,6   | 17,8 |

**ΣΥΝΘΕΣΗ**  
Η αναλυτική σύνθεση φαίνεται πάνω στην ετικέτα  
βιταμίνες και μέταλλα, θαλάσσια υποπροϊόντα, ιχθυάλευρο, ιχθυέλαιο, λειτουργικά συστατικά, προϊόντα σιτηρών, πρωτεΐνες ενός κυττάρου, υποπροϊόντα όχι μαρίνα, φυτικά έλαια, φυτικές πρωτεΐνες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
κιλά τροφής ανά 100 κιλά ψαριού ημερησίως

| Βάρος ψαριού (γρ) | MM     | Θερμοκρασία νερού (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|--------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                   |        | 12                     | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   | 28   |
| 20-50             | 3 mm   | 0,59                   | 0,83 | 1,12 | 1,49 | 1,98 | 2,64 | 3,14 | 3,31 | 2,97 |
| 50-100            | 3 mm   | 0,48                   | 0,66 | 0,9  | 1,19 | 1,59 | 2,12 | 2,51 | 2,64 | 2,38 |
| 100-200           | 4.5 mm | 0,38                   | 0,53 | 0,72 | 0,95 | 1,26 | 1,68 | 2    | 2,11 | 1,9  |
| 200-400           | 4.5 mm | 0,3                    | 0,42 | 0,57 | 0,76 | 1,01 | 1,35 | 1,6  | 1,68 | 1,52 |
| 400-600           | 6 mm   | 0,24                   | 0,33 | 0,45 | 0,6  | 0,8  | 1,07 | 1,27 | 1,33 | 1,2  |

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΌΤΗΤΕΣ  
Τα στοιχεία είναι ανά 100 kg παραγωγής ψαριών

|                        | 3 mm |      |      | 4.5 mm |      |      | 6 mm |      |      |
|------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| Μετατρεψιμότητα        | 1,3  | 1,4  | 1,5  | 1,4    | 1,5  | 1,6  | 1,5  | 1,6  | 1,7  |
| N στα περιττώματα (kg) | 0,77 | 0,82 | 0,88 | 0,73   | 0,79 | 0,84 | 0,77 | 0,82 | 0,87 |
| N στο νερό (kg)        | 6,05 | 6,73 | 7,41 | 5,7    | 6,3  | 6,91 | 6,08 | 6,67 | 7,26 |
| P στα περιττώματα (kg) | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,4    | 0,43 | 0,46 | 0,43 | 0,46 | 0,49 |
| P στο νερό (kg)        | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,5    | 0,57 | 0,64 | 0,57 | 0,64 | 0,7  |

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΊΠΤΩΞΗ ΜΕΤΡΌΥΜΕΝΗ ΣΕ CO<sub>2</sub>- EQ  
Οι μετρήσεις εκφράζονται σε ισοδύναμο του Διοξειδίου του Άνθρακα ( CO<sub>2</sub>) kg/kg τροφής)

|                                              | 3 mm      | 4.5 mm    | 6 mm      |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ισοδ.CO <sub>2</sub> με αλλαγή χρήσης γης    | 1,68-1,83 | 1,81-1,86 | 1,84-1,84 |
| Ισοδ.CO <sub>2</sub> χωρίς αλλαγή χρήσης γης | 1,09-1,15 | 1,08-1,13 | 1,11-1,11 |