

# Осетр
# ALLER STURGEON REP EX

## Корм для производителей

## СОСТАВ

| | 8 mm |
|---|---|
| Протеин (%) | 52 |
| Жир (%) | 12 |
| Углеводы (%) | 17,9 |
| Зола (%) | 8,5 |
| Волокно (%) | 1,6 |
| Фосфор (%) | 1,4 |
| Энергетическая ценность (МДж) | 20,3 |
| Усваиваемая энергия (МДж) | 17,8 |

## КОМПОНЕНТЫ

Сырье перечисленно в алфавитном порядке. Полный состав будет указан на этикетке

витамины и минералы, зерновые продукты, крилевая мука, одноклеточные белки, растительные белки, рыбий жир, рыбная мука, функциональные ингредиенты.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА КОРМЛЕНИЯ

Кг корма на 100 кг рыбы в день

| | | Температура воды в (°C) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рыба (гр)** | **MM** | **10** | **12** | **14** | **16** | **18** | **20** | **22** | **24** | **26** |
| 4000-7000 | 8 | 0,03 | 0,12 | 0,2 | 0,27 | 0,33 | 0,3 | 0,27 | 0,17 | 0,03 |

## ВЛИЯНИЕ КОРМА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

На 100 кг рыбы

| | 8 mm | | |
|---|---|---|---|
| Кормовой коэффициент | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Азот в экскриментах (кг) | 0,73 | 0,8 | 0,87 |
| Азот в воде (кг) | 5,67 | 6,44 | 7,2 |
| Фосфор в экскриментах (кг) | 0,39 | 0,43 | 0,47 |
| Фосфор в воде (кг) | 0,49 | 0,57 | 0,66 |

## ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИЗМЕРЯЕТСЯ В $CO_2$-EQ

Цифры в $CO_2$ эквиваленте (кг/кг корма)

| | 8 mm |
|---|---|
| $CO_2$-экв. с изменением землепользования | 1,09-1,32 |
| $CO_2$-экв. без изменения землепользования | 1,09-1,25 |

29/03/2024