



أعلاف الامهات

تحليل

mm 6	mm 4	mm 3	
36	36	36	بروتين خام (%)
7	7	7	دهن خام (%)
37,3	37,3	37,3	NFE (%)
7,8	7,8	7,8	رماد (%)
3,9	3,9	3,9	ألياف (%)
1,0	1,0	1,0	فوسفور (%)
18,3	18,3	18,3	طاقة كلية (م جول)
16,4	16,4	16,4	طاقة مهضومة (م جول)

تركيب

المواد الخام مرتبة أبجدياً . التركيب الكامل موضح على الكارت

جلوتين ذرة, زيت سمك, زيت صويا, كسب فول الصويا, مسحوق ريش, مسحوق سمك, منتجات أرز, منتجات قمح, نواتج تقطير الذرة.

مستويات التغذية الموصى بها

كجم علف لكل 100 كجم سمك يومياً

درجة حرارة الماء									MM	سمك (كجم)
32	30	28	26	24	22	20	18	16		
2,37	2,66	2,96	2,66	2,22	1,77	1,18	0,74	0,44	3	60-100
1,89	2,13	2,37	2,13	1,77	1,42	0,95	0,59	0,35	3	100-200
1,51	1,7	1,89	1,7	1,42	1,14	0,76	0,47	0,28	3	200-400
1,21	1,36	1,51	1,36	1,14	0,91	0,61	0,38	0,23	4	400-800
0,97	1,09	1,21	1,09	0,91	0,72	0,48	0,3	0,18	6	800<

الأثر البيئي مع معدلات التحويل الغذائي المختلفة

الأشكال تكون لكل 100 كجم إنتاج سمكي

mm 6			mm 4			mm 3			
1,5	1,4	1,3	1,4	1,3	1,2	1,3	1,2	1,1	التحويل الغذائي
0,69	0,65	0,6	0,65	0,6	0,55	0,6	0,55	0,51	نيتروجين في المخلفات (كجم)
5,2	4,67	4,14	4,67	4,14	3,61	4,14	3,61	3,08	نيتروجين في الماء (كجم)
0,47	0,44	0,41	0,44	0,41	0,38	0,41	0,38	0,34	فوسفور في المخلفات (كجم)
0,6	0,59	0,52	0,59	0,52	0,45	0,52	0,45	0,37	فوسفور في الماء (كجم)

26/04/2024