

دنيس
ALLER INFA EX GR, 0.1-0.4 MM

علف زريعة

تحليل

	mm 0.1	mm 0.2	mm 0.4
بروتين خام (%)	64	64	64
دهن خام (%)	10	10	10
NFE (%)	6,9	6,9	6,9
رماد (%)	12,1	12,1	12,1
ألياف (%)	1,0	1,0	1,0
فوسفور (%)	1,4	1,4	1,4
طاقة كلية (م جول)	19,4	19,4	19,4
طاقة مهضومة (م جول)	18,0	18,0	18,0

تركيب

المواد الخام مرتبة أبجديا . التركيب الكامل موضح على الكارت

بروتينات نباتية, زيت سمك, فيتامينات ومعادن, مسحوق جمبرى, مسحوق سمك, مكونات وظيفية, منتجات الحبوب.

مستويات التغذية الموصى بها

كجم علف لكل 100 كجم سمك يومياً

سمك (جم)	مفتت		درجة حرارة الماء								
			12	14	16	18	20	22	24	26	28
0.05-0.10	0.1	0.1	2,47	3,44	4,67	6,18	8,25	11	13,06	13,74	12,37
0.10-0.20	0.2	0.2	2,15	2,99	4,06	5,38	7,17	9,56	11,35	11,95	10,76
0.20-0.40	0.4	0.4	1,87	2,6	3,53	4,68	6,24	8,31	9,87	10,39	9,35

الأثر البيئى مع معدلات التحويل الغذائى المختلفة

الأشكال تكون لكل 100 كجم إنتاج سمكى

	mm 0.1			mm 0.2			mm 0.4		
التحويل الغذائى	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
نيتروجين فى المخلفات (كجم)	0,31	0,37	0,43	0,37	0,43	0,49	0,43	0,49	0,55
نيتروجين فى الماء (كجم)	2,06	3,03	3,99	3,03	3,99	4,95	3,99	4,95	5,91
فوسفور فى المخلفات (كجم)	0,23	0,27	0,32	0,27	0,32	0,36	0,32	0,36	0,41
فوسفور فى الماء (كجم)	0,1	0,2	0,31	0,2	0,31	0,41	0,31	0,41	0,52

28/03/2024