

دنيس
ALLER MARINE 48/15 EX

علف زريعة

تحليل

	mm 1.5	mm 2
بروتين خام (%)	48	48
دهن خام (%)	15	15
NFE (%)	19,6	19,6
رماد (%)	7,1	7,1
ألياف (%)	2,3	2,3
فوسفور (%)	1,1	1,1
طاقة كلية (م جول)	21,0	21,0
طاقة مهضومة (م جول)	16,0	16,0

تركيب

المواد الخام مرتبة أبجديا . التركيب الكامل موضح على الكارت

جلوتين ذرة, زيت سمك, زيت صويا, فيتامينات ومعادن, قمح, مسحوق جمبرى, مسحوق سمك, مسحوق عباد الشمس, منتجات أرز, منتجات قمح, نواتج تقطير الذرة.

مستويات التغذية الموصى بها

كجم علف لكل 100 كجم سمك يومياً

سمك (جم)	MM	درجة حرارة الماء								
		12	14	16	18	20	22	24	26	28
7-10	mm 1.5	0,85	1,2	1,54	1,88	2,22	2,73	3,25	3,42	2,91
10-15	mm 2	0,79	1,1	1,49	1,97	2,63	3,51	4,16	4,38	3,94
15-20	mm 2	0,69	0,96	1,31	1,74	2,31	3,09	3,66	3,86	3,47

الأثر البيئى مع معدلات التحويل الغذائى المختلفة

الأشكال تكون لكل 100 كجم إنتاج سمكى

	mm 1.5			mm 2		
التحويل الغذائى	0,8	0,9	1	0,9	1	1,1
نيتروجين فى المخلفات (كجم)	0,49	0,55	0,61	0,55	0,61	0,68
نيتروجين فى الماء (كجم)	2,9	3,61	4,32	3,61	4,32	5,02
فوسفور فى المخلفات (كجم)	0,26	0,3	0,33	0,3	0,33	0,36
فوسفور فى الماء (كجم)	0,19	0,26	0,34	0,26	0,34	0,42

29/03/2024