

Yellowtail kingfish ALLER 56/18 EX



Voksefoder



DEKLARATION

| | 9 mm | 10 mm |
|------------------------|------|-------|
| Råprotein (%) | 56 | 56 |
| Råfedt (%) | 18 | 18 |
| NFE (%) | 7,9 | 7,7 |
| Råaske (%) | 9,1 | 9,5 |
| Træstof (%) | 1,0 | 0,8 |
| P (%) | 1,2 | 1,2 |
| Bruttoenergi (MJ) | 21,8 | 21,8 |
| Fordøjelig energi (MJ) | 20,1 | 20,1 |

SAMMENSÆTNING

For aktuel sammensætning henvises til foderets mærkning.

fiskemel, fiskeolie, hvede, hvedegluten, rapsolie, soja protein koncentrat, vitaminer og mineraler.

VEJLEDENDE FODERTABEL

Kg foder per 100 kg fisk per dag

| Fisk (gr) | MM | Vandtemperatur (°C) | | | | | | | | |
|-----------|----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| >1500 | 9 | 0,23 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 0,94 | 0,8 |

MILJØPÅVIRKNING VED FORSKELLIGE FODERKVOTIENTER.

Tallene er for produktion af 100 kg fisk

| | 9 mm | | |
|-------------------|------|------|------|
| Foderkvotient | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| N i fækalier (kg) | 0,59 | 0,65 | 0,7 |
| N i vand (kg) | 6,51 | 7,36 | 8,2 |
| P i fækalier (kg) | 0,4 | 0,43 | 0,47 |
| P i vand (kg) | 0,5 | 0,58 | 0,67 |