

# Οξύρυγχος ALLER BRONZE

## Τροφή πάχυνσης

### ΣΎΣΤΑΣΗ

| | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ολική πρωτεΐνη (%) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ολικό λίπος (%) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ΕΝΕΟ (%) | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Τέφρα (%) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Φυτικές Ίνες (%) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| P (%) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Ολική ενέργεια (MJ) | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Πεπτή ενέργεια (MJ) | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |

### ΣΎΝΘΕΣΗ

Η αναλυτική σύνθεση φαίνεται πάνω στην ετικέτα

βιταμίνες και μέταλλα, θαλάσσια υποπροϊόντα, ιχθυάλευρο, μεταποιημένα ζωικά έλαια, μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, προϊόντα αίματος, προϊόντα σιτηρών, πρωτεΐνες ενός κυττάρου, υποπροϊόντα όχι μαρίνα, φυτικά έλαια, φυτικές πρωτεΐνες.

### ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ

κιλά τροφής ανά 100 κιλά ψαριού ημερησίως

| | | Θερμοκρασία νερού (°C) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βάρος ψαριού (γρ) | MM | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 50-100 | 3 mm | 0,21 | 0,74 | 1,27 | 1,7 | 2,12 | 1,91 | 1,7 | 1,06 | 0,21 |
| 100-200 | 3 mm | 0,18 | 0,62 | 1,06 | 1,41 | 1,76 | 1,59 | 1,41 | 0,88 | 0,18 |
| 200-800 | 4.5 mm | 0,15 | 0,51 | 0,88 | 1,17 | 1,46 | 1,32 | 1,17 | 0,73 | 0,15 |
| 800-1500 | 4.5 mm | 0,12 | 0,42 | 0,73 | 0,97 | 1,21 | 1,09 | 0,97 | 0,61 | 0,12 |
| 1500-3000 | 6 mm | 0,1 | 0,35 | 0,6 | 0,81 | 1,01 | 0,91 | 0,81 | 0,5 | 0,1 |
| 3000-4000 | 6 mm | 0,08 | 0,29 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 0,75 | 0,67 | 0,42 | 0,08 |
| 4000-7000 | 8 mm | 0,07 | 0,24 | 0,42 | 0,56 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,35 | 0,07 |

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΌΤΗΤΕΣ

Τα στοιχεία είναι ανά 100 kg παραγωγής ψαριών

| | 3 mm | | | 4.5 mm | | | 6 mm | | | 8 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μετατρεψιμότητα | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| N στα περιττώματα (kg) | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 0,86 |
| N στο νερό (kg) | 3,87 | 4,54 | 5,2 | 4,54 | 5,2 | 5,86 | 5,2 | 5,86 | 6,52 | 5,86 | 6,52 | 7,19 |
| P στα περιττώματα (kg) | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | 0,42 | 0,45 |
| P στο νερό (kg) | 0,26 | 0,33 | 0,4 | 0,33 | 0,4 | 0,47 | 0,4 | 0,47 | 0,54 | 0,47 | 0,54 | 0,61 |

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΊΠΤΩΣΗ ΜΕΤΡΟΎΜΕΝΗ ΣΕ $CO_2$- EQ

Οι μετρήσεις εκφράζονται σε ισοδύναμο του Διοξειδίου του Άνθρακα ( $CO_2$) kg/kg τροφής)

| | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ισοδ.$CO_2$ με αλλαγή χρήσης γης | 1,29-3,43 | 1,29-3,43 | 1,29-3,43 | 1,29-3,43 |
| Ισοδ.$CO_2$ χωρίς αλλαγή χρήσης γης | 0,97-2,12 | 0,97-2,12 | 0,97-2,12 | 0,97-2,12 |

28/03/2024