

Κρανιός
ALLER THALASSA EX GR, 0.5-2.0 MM

Τροφή για ιχθύδια

ΣΎΣΤΑΣΗ

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
Ολική πρωτεΐνη (%)	62	62	60
Ολικό λίπος (%)	12	12	14
ΕΝΕΟ (%)	6,2	6,2	6,6
Τέφρα (%)	13,0	13,0	12,6
Φυτικές Ίνες (%)	0,8	0,8	0,8
P (%)	1,4	1,4	1,4
Ολική ενέργεια (MJ)	20,6	20,6	21,0
Πεπτή ενέργεια (MJ)	19,1	19,1	19,3

ΣΎΝΘΕΣΗ

Η αναλυτική σύνθεση φαίνεται πάνω στην ετικέτα

άλευρο κρίλ, βιταμίνες και μέταλλα, ιχθυάλευρο, ιχθυέλαιο, λειτουργικά συστατικά, προϊόντα σιτηρών, πρωτεΐνη από μονοκύτταρους οργανισμούς, φυτικές πρωτεΐνες.

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ

κιλά τροφής ανά 100 κιλά ψαριού ημερησίως

Βάρος ψαριού (γρ)	Granulate	Θερμοκρασία νερού (°C)									
			12	14	16	18	20	22	24	26	28
1-4	0.5-1.0	0.5-1.0	3,71	4,64	5,57	6,49	7,42	8,35	8,81	9,28	8,81
4-7	0.9-1.6	0.9-1.6	3,04	3,8	4,56	5,32	6,08	6,84	7,22	7,61	7,22
7-10	1.3-2.0	1.3-2.0	2,55	3,19	3,82	4,46	5,1	5,73	6,05	6,37	6,05

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΌΤΗΤΕΣ

Τα στοιχεία είναι ανά 100 kg παραγωγής ψαριών

	0.5-1.0 mm			0.9-1.6 mm			1.3-2.0 mm		
Μετατρεψιμότητα	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
N στα περιττώματα (kg)	0,3	0,36	0,42	0,36	0,42	0,48	0,4	0,46	0,52
N στο νερό (kg)	1,91	2,84	3,78	2,84	3,78	4,71	3,57	4,47	5,37
P στα περιττώματα (kg)	0,21	0,25	0,29	0,25	0,29	0,34	0,29	0,34	0,38
P στο νερό (kg)	0,06	0,16	0,26	0,16	0,26	0,35	0,26	0,35	0,45

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΊΠΤΩΣΗ ΜΕΤΡΟΎΜΕΝΗ ΣΕ CO_2- EQ

Οι μετρήσεις εκφράζονται σε ισοδύναμο του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO_2) kg/kg τροφής)

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
Ισοδ.CO_2 με αλλαγή χρήσης γης	1,11-1,28	1,11-1,28	1,11-1,28
Ισοδ.CO_2 χωρίς αλλαγή χρήσης γης	1,08-1,23	1,08-1,23	1,08-1,23

29/03/2024