

بوري
ALLER TIL-PRO 30% EX

علف زريعة

تحليل

	mm 1.5	mm 2
بروتين خام (%)	30	30
دهن خام (%)	5	5
NFE (%)	44,8	44,8
رماد (%)	6,8	6,8
ألياف (%)	5,4	5,4
فوسفور (%)	0,8	0,8
طاقة كلية (م جول)	17,7	17,7
طاقة مهضومة (م جول)	8,6	8,6

تركيب

المواد الخام مرتبة أبجديا . التركيب الكامل موضح على الكارت

أذره, جلوتين ذرة, رجيع كون, زوائد طحن قمح, زيت سمك, زيت صويا, فوسفات كالسيوم احادية, فيتامينات ومعادن, كسب فول الصويا, مسحوق سمك, مسحوق عباد الشمس, ملح طعام, منتجات قمح, نواتج تقطير الذرة.

مستويات التغذية الموصى بها

كجم علف لكل 100 كجم سمك يومياً

سمك (جم)	MM	درجة حرارة الماء								
		16	18	20	22	24	26	28	30	32
5-10	mm 1.5	1,51	2,52	4,02	6,04	7,55	9,06	10,06	9,06	8,05
10-30	mm 1.5	1,24	2,06	3,3	4,95	6,19	7,42	8,25	7,42	6,6
30-60	mm 2	1,01	1,69	2,7	4,06	5,07	6,08	6,76	6,08	5,41
60-100	mm 2	0,81	1,25	2,16	3,24	4,06	4,87	5,41	4,87	4,33

الأثر البيئى مع معدلات التحويل الغذائى المختلفة

الأشكال تكون لكل 100 كجم إنتاج سمكى

	mm 1.5			mm 2		
التحويل الغذائى	1,2	1,3	1,4	1,3	1,4	1,5
نيتروجين فى المخلفات (كجم)	0,46	0,5	0,54	0,5	0,54	0,58
نيتروجين فى الماء (كجم)	2,55	2,99	3,43	2,99	3,43	3,87
فوسفور فى المخلفات (كجم)	0,3	0,32	0,34	0,32	0,34	0,37
فوسفور فى الماء (كجم)	0,34	0,4	0,45	0,4	0,45	0,51

25/04/2024