



Sum afrykański ALLER PRIMO FLOAT

Pasza wzrostowa



SKŁAD

	3 mm	4.5 mm	6 mm
Białko (%)	37	37	37
Tłuszcz (%)	12	12	12
NFE (%)	35,2	35,2	35,2
Popiół (%)	6,2	6,2	6,2
Włókno (%)	3,6	3,6	3,6
P (%)	1,0	1,0	1,0
Energia całkowita (MJ)	20,1	20,1	20,1
Energia strawna (MJ)	15,4	15,4	15,4

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka roślinne, maczka rybna, maczka z krwi, morskie produkty uboczne, olej rybny, oleje roślinne, produkty zbożowe, przetworzone białka zwierzęce, witaminy i minerały.

ZALECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

Ryba (g)	MM	Temperatura wody (°C)					
		20	22	24	26	28	30
50-100	3 mm	2,82	3,53	4,23	4,7	4,23	3,76
100-150	3 mm	2,26	2,82	3,39	3,76	3,39	3,01
150-300	4.5 mm	1,81	2,26	2,71	3,01	2,71	2,41
300-500	4.5 mm	1,44	1,81	2,17	2,41	2,17	1,93
500-1000	6 mm	1,16	1,44	1,73	1,93	1,73	1,54
1000-1500	6 mm	0,92	1,16	1,39	1,54	1,39	1,23

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

		3 mm			4.5 mm			6 mm	
Współczynnik pokarmowy	1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4
N w odchodach (kg)	0,47	0,52	0,57	0,52	0,57	0,62	0,57	0,62	0,66
N w wodzie (kg)	2,7	3,24	3,79	3,24	3,79	4,33	3,79	4,33	4,87
P w odchodach (kg)	0,3	0,33	0,36	0,33	0,36	0,39	0,36	0,39	0,42
P w wodzie (kg)	0,28	0,35	0,42	0,35	0,42	0,49	0,42	0,49	0,56

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO₂E

Wartości są w CO₂e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	3 mm	4.5 mm	6 mm
CO ₂ -eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,06-1,48	1,06-1,48	1,06-1,48
CO ₂ -eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	0,88-1,05	0,88-1,05	0,88-1,05