

Sum afrykański ALLER BONA FLOAT, 2 MM

Pasza narybkowa



SKŁAD

	2 mm
Białko (%)	42
Tłuszcz (%)	12
NFE (%)	28,2
Popiół (%)	6,8
Włókno (%)	3,0
P (%)	1
Energia całkowita (MJ)	20
Energia strawna (MJ)	15,8

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka roślinne, maczka rybna, maczka z krwi, morskie produkty uboczne, olej rybny, oleje roślinne, produkty zbożowe, przetworzone białka zwierzęce, witaminy i minerały.

ZAŁECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

Ryba (g)	MM	Temperatura wody (°C)				
		22	24	26	28	30
10-30	2 mm	4,25	5,1	5,67	5,1	4,54
30-50	2 mm	3,62	4,34	4,82	4,34	3,86

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	2 mm		
Współczynnik pokarmowy	0,8	0,9	1
N w odchodach (kg)	0,43	0,48	0,54
N w wodzie (kg)	2,2	2,81	3,43
P w odchodach (kg)	0,26	0,3	0,33
P w wodzie (kg)	0,19	0,27	0,34

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO₂E

Wartości są w CO₂e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	2 mm
CO ₂ -eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,03-1,79
CO ₂ -eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	0,86-1,02

19/04/2024