

Sum afrykański ALLER CLARIA FLOAT, 2 MM

Pasza narybkowa



SKŁAD

	2 mm
Białko (%)	45
Tłuszcz (%)	12
NFE (%)	25,1
Popiół (%)	6,4
Włókno (%)	3,5
P (%)	0,9
Energia całkowita (MJ)	20,3
Energia strawna (MJ)	17,2

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka pojedynczych komórek, białka roślinne, maczka rybna, maczka z krwi, morskie produkty uboczne, olej rybny, oleje roślinne, produkty uboczne inne niż morskie, produkty zbożowe, przetworzone białka zwierzęce, witaminy i minerały.

ZAŁECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

Ryba (g)	MM	Temperatura wody (°C)				
		22	24	26	28	30
10-30	2 mm	4,25	5,1	5,67	5,1	4,54
30-50	2 mm	3,62	4,34	4,82	4,34	3,86

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	2 mm		
Współczynnik pokarmowy	0,7	0,8	0,9
N w odchodach (kg)	0,4	0,46	0,52
N w wodzie (kg)	1,89	2,55	3,21
P w odchodach (kg)	0,21	0,24	0,27
P w wodzie (kg)	0,06	0,13	0,2

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO₂E

Wartości są w CO₂e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	2 mm
CO ₂ -eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,22-1,60
CO ₂ -eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	0,82-0,99