

Sum afrykański
ALLER FUTURA EX GR, 0.5-2.0 MM

Pasza narybkowa

SKŁAD

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
Bialko (%)	60	60	58
Tluszcz (%)	15	15	17
NFE (%)	5,7	5,7	6,1
Popiól (%)	12,6	12,6	12,2
Wlókno (%)	0,7	0,7	0,7
P (%)	1,4	1,4	1,4
Energia calkowita (MJ)	21,2	21,2	21,6
Energia strawna (MJ)	19,7	19,7	20,0

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka pojedynczych komórek, białka roślinne, maczka rybna, maczka z kryla, olej rybny, produkty zbożowe, składniki funkcjonalne, witaminy i mineraly.

ZALECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

			Temperatura wody (°C)				
Ryba (g)	Granulate	22	24	26	28	30	
0.3-1.5	0.5-1.0 mm	4,57	5,48	6,09	5,48	4,87	
1.5-4.0	0.9-1.6 mm	4,34	5,21	5,79	5,21	4,63	
4.0-10.0	1.3-2.0 mm	3,91	4,69	5,21	4,69	4,17	

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	0.5-1.0 mm			0.9-1.6 mm			1.3-2.0 mm		
Współczynnik pokarmowy	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
N w odchodach (kg)	0,29	0,35	0,4	0,35	0,4	0,46	0,39	0,45	0,5
N w wodzie (kg)	1,76	2,66	3,57	2,66	3,57	4,47	3,36	4,23	5,1
P w odchodach (kg)	0,21	0,25	0,29	0,25	0,29	0,34	0,29	0,34	0,38
P w wodzie (kg)	0,06	0,16	0,26	0,16	0,26	0,35	0,26	0,35	0,45

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO_2E

Wartości są w CO_2e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
CO_2-eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,11-1,28	1,11-1,28	1,11-1,28
CO_2-eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	1,08-1,23	1,08-1,23	1,08-1,23