

# Dorsz OCEAN QUANTUM EX, 2 MM



Pasza narybkowa



## SKŁAD

|                        | 2 mm |
|------------------------|------|
| Białko (%)             | 56   |
| Tłuszcz (%)            | 16   |
| NFE (%)                | 8,4  |
| Popiół (%)             | 10,6 |
| Włókno (%)             | 1,0  |
| P (%)                  | 1,6  |
| Energia całkowita (MJ) | 21,1 |
| Energia strawna (MJ)   | 19,5 |

## SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka roślinne, maczka rybna, morskie produkty uboczne, olej rybny, produkty zbożowe, witaminy i minerały.

## ZAŁECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

| Ryba (g) | MM   | Temperatura wody (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |      | 2                     | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |
| 15-20    | 2 mm | 0,9                   | 1,49 | 1,79 | 2,15 | 2,8  | 2,98 | 2,83 | 2,54 | 1,94 |
| 20-50    | 2 mm | 0,81                  | 1,36 | 1,63 | 1,95 | 2,55 | 2,71 | 2,58 | 2,31 | 1,76 |

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

|                        | 2 mm |      |      |
|------------------------|------|------|------|
| Współczynnik pokarmowy | 0,6  | 0,7  | 0,8  |
| N w odchodach (kg)     | 0,32 | 0,38 | 0,43 |
| N w wodzie (kg)        | 2,3  | 3,15 | 3,99 |
| P w odchodach (kg)     | 0,3  | 0,35 | 0,4  |
| P w wodzie (kg)        | 0,26 | 0,38 | 0,49 |

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO<sub>2</sub>E

Wartości są w CO<sub>2</sub>e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

|                                                             | 2 mm      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów  | 1,15-1,26 |
| CO <sub>2</sub> -eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów | 1,13-1,22 |

27/04/2024