

Sandart OCEAN IVORY EX



Voksefoder



DEKLARATION

| | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm |
|------------------------|------|--------|------|
| Råprotein (%) | 56 | 54 | 54 |
| Råfedt (%) | 18 | 20 | 20 |
| NFE (%) | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| Råaske (%) | 10,9 | 11,0 | 11,0 |
| Træstof (%) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| P (%) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Bruttoenergi (MJ) | 22,0 | 22,2 | 22,2 |
| Fordøjelig energi (MJ) | 20,5 | 20,6 | 20,6 |

SAMMENSÆTNING

For aktuell sammensætning henvises til foderets mærkning.

fiskemel, fiskeolie, kornprodukter, vegetabiliske proteiner, vitaminer og mineraler.

VEJLEDENDE FODERTABEL

Kg foder per 100 kg fisk per dag

| Fisk (gr) | MM | Vandtemperatur (°C) | | | | |
|-----------|--------|---------------------|------|------|------|------|
| | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 50-100 | 3 mm | 0,88 | 1,09 | 1,31 | 1,46 | 1,31 |
| 100-150 | 4.5 mm | 0,78 | 0,98 | 1,17 | 1,3 | 1,17 |
| 150-300 | 4.5 mm | 0,7 | 0,88 | 1,06 | 1,17 | 1,06 |
| 300-500 | 6 mm | 0,63 | 0,79 | 0,95 | 1,06 | 0,95 |
| 500-1000 | 6 mm | 0,57 | 0,71 | 0,86 | 0,95 | 0,86 |
| >1000 | 6 mm | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 0,86 | 0,77 |

MILJØPÅVIRKNING VED FORSKELLIGE FODERKVOTIENTER.

Tallene er for produktion af 100 kg fisk

| | 3 mm | | | 4.5 mm | | | 6 mm | | |
|-------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| Foderkvotient | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| N i fækalier (kg) | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,52 | 0,57 | 0,62 |
| N i vand (kg) | 3,75 | 4,56 | 5,37 | 4,56 | 5,37 | 6,18 | 5,37 | 6,18 | 7 |
| P i fækalier (kg) | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,4 |
| P i vand (kg) | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,27 | 0,35 | 0,42 | 0,35 | 0,42 | 0,5 |

MILJØPÅVIRKNING MÅLT I CO₂-EQ

Angivet som CO₂-ækvivalent (kg/kg foder)

| | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm |
|---|-----------|-----------|-----------|
| CO ₂ -eq. med arealanvendelse | 1,09-1,38 | 1,09-1,59 | 1,07-1,59 |
| CO ₂ -eq. uden arealanvendelse | 1,07-1,34 | 1,07-1,55 | 1,09-1,55 |

13/08/2024